

## **Νέα όπλα στη φαρέτρα για τη λευχαιμία**

**ΚΑΛΑ ΝΕΑ** όσον αφορά την αντιμετώπιση των αιματολογικών καρκίνων, όπως η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία και το οξώδες λέμφωμα, καθώς τα αποτελέσματα κλινικών ερευνών δείχνουν ότι η χρήση νεότερων θεραπειών αυξάνει τον χρόνο επιβίωσης των ασθενών.

«Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας ισχυρά όπλα για να καταστήσουμε τη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία μία ασθένεια αντιμετωπίσιμη για μεγάλο χρονικό διάστημα» είπαν η Μαρία Αγγελοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Αιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο Ιωάννης Κοτσιανίδης, καθηγητής Αιματολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου.

Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια νέα θεραπεία για τη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, που βασίζεται στη χορήγηση της ομπινουτουζουμάμπης σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με κλωραμβουκίλη. Η νέα θεραπεία μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου ή θανάτου κατά 54% συγκριτικά με άλλες συνδυαστικές θεραπείες. Μάλιστα, η επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου ήταν 28,7 μήνες για τους ασθενείς που έλαβαν τον συνδυασμό ομπινουτουζουμάμπη - κλωραμβουκίλη συγκριτικά με τους 15,7 μήνες για εκείνους στους οποίους χορηγήθηκε ριουξιμάμπη - κλωραμβουκίλη.

Ακόμη, αυξάνει κατά έναν περίπου χρόνο το διάστημα μέχρι την επόμενη θεραπεία συγκριτικά με τη ριουξιμάμπη, ξεπερνώντας τα τέσσερα έτη. Παράλληλα, η χορήγηση ομπινουτουζουμάμπης σε συνδυασμό με βενδαμουσίνη, ακολουθούμενη από μονοθεραπεία με ομπινουτουζουμάμπη οδήγησε σε μείωση κατά 52% του κινδύνου εξέλιξης της νόσου ή θανάτου.